UNIVERSITÉ MOHAMED I

FACULTÉ DES SCIENCES
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES
ET INFORMATIQUE
O u j d a

Année Universitaire 2007/08Section: SMP-SMC (S_1) Session de Janvier Durée: 1H 30

Examen d'algèbre(Math1)

EXERCICE I.

- 1. Calculer $\mid \frac{(1+i)^{13}}{(\sqrt{3}+i)^7} \mid \cdot$
- 2. Identifier le lieu des points du plan de Gauss satisfaisant

$$1 < |z + 2i| < 2.$$

- 3. De quel angle faut-il tourner le vecteur associé au nombre complexe $z_1 = \sqrt{3} + i$ pour obtenir le vecteur associé au nombre complexe $z_2 = \sqrt{2} + \sqrt{2} i$.
- 4. En utilisant les formules d'Euler, écrire $\cos 2x \cos^2 x$ sous la formes $\sum (A_k \cos kx + B_k \sin kx)$.

EXERCICE II. Soit le groupe $G = \{-1, 1\} \times \{-1, 1\}$ muni de la loi de composition

$$(x_1, y_1) * (x_2, y_2) = (x_1 x_2, y_1 y_2).$$

- 1. Donner l'élément neutre de G.
- 2. Donner la table d'opération de G.

EXERCICE III.

- 1. Donner la division euclidienne de $X^4 + X^2 + 1$ par $X^2 + X + 1$.
- 2. Donner deux polynômes U et V tels que

$$U(X^{2} + X + 1) + V(X^{2} - X + 1) = 1.$$

3. Déduire la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ de la fraction rationnelle

$$G = \frac{2X}{(X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1)}$$

4. Donner la décomposition en éléments simples de G dans $\mathbb{C}(X)$.

EXERCICE IV.

- 1. Montrer que les vecteurs U=(1,0,0), V=(0,2,0) et W=(0,0,3) forment une base de \mathbb{R}^3 .
- 2. Pour quelle condition un élément (x, y, z) de \mathbb{R}^3 est dans $vect\{V, W\}$?

 \mathbf{Fin}